



# PATIËNTEN INFORMATIE

## Synacthentest



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11  
E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)  
I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

mzp22805 juni 2016

Uw arts heeft met u besproken dat er een synacthentest bij u gedaan gaat worden. Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over deze synacthentest. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

U wordt voor de test verwacht op de afdeling Dagbehandeling op:

\_\_\_\_\_dag \_\_\_\_\_om  
\_\_\_\_\_uur.

### Algemeen

De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, produceert verschillende hormonen waaronder het hormoon cortisol. Cortisol zorgt er onder andere voor dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven. In stresssituaties wordt door de bijnier extra cortisol aangemaakt.

Wanneer de werking van de bijnierschors afneemt is het cortisolgehalte in het bloed verlaagd. Het doel van de synacthentest is het vaststellen van een tekort aan cortisol. Synacthen stimuleert de bijnierschors tot een tijdelijke afgifte van extra cortisol. De hoeveelheid aangemaakte cortisol in het bloed wordt op verschillende tijdstippen tijdens de test gemeten.

### Het onderzoek

Tijdens de test zit u op een stoel en de verpleegkundige brengt een infuusnaald in uw arm. U moet dan 15 minuten rustig blijven zitten. Na die 15 minuten wordt via het infuus bloed afgenomen. Nadat het bloed is geprikt, krijgt u via het infuus Synacthen toegediend. Hierna moet u weer 60 minuten rustig blijven zitten. Na 30 en 60 minuten komt de verpleegkundige wederom bloed bij u afnemen. Vervolgens wordt het infuus verwijderd en is de test klaar.

Het totale onderzoek duurt ongeveer twee uur.

### Na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het volgende bezoek aan uw behandelend specialist.

### Wat te doen als u verhinderd bent?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent om uw afspraak na te komen, laat het ons dan tijdig weten. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar via (010) 291 22 20.

